

# GynObstetrik



**Abort**

Health Department

the33 ©

## *Innehållsförteckning*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Abort.....                          | 2 |
| Olika abort metoder.....            | 2 |
| Medicinsk abort.....                | 2 |
| Vacuumexeres (kirurgisk abort)..... | 2 |
| Sen abort.....                      | 3 |
| Lagen om abort.....                 | 3 |

## Abort

---

Abort innebär att graviditeten avbryts och är fritt (i Sverige) till och med graviditetsvecka 18+0. På särskilda indikationer kan abort beviljas av socialstyrelsen med en speciell ansökan upp till graviditetsvecka 22+0. Efter v22 är abort inte tillåtet oavsett orsaken (om inte maternell liv är i direkt hot, [se lagen om abort](#)) i Sverige. Abort är en av de vanligaste medicinska åtgärder och nära hälften av alla kvinnor gör någon gång abort.

2 Metoderna för abort är olika och beror framför allt på hur lågt kvinnan har gått i graviditeten.

### 1. **Medicinsk abort** (från om med graviditetsvecka 9+0)

Är rekommenderat fram till nionde vecka efter senaste mens (63 dagar). Detta sker via hormon preparat som framkallar sammandragningar i uterus vilket i sig leda till missfall.

#### **Medel vid medicinsk abort:**

I ca 80 % av fallen använder man en kombination av antiprogesteron (*Mifepriston*®) och en prostaglandin analog (*Misoprostol*®). Behandlingen sker i kliniken eller poliklinisk (viktigt att kvinnan har ett fungerande socialt nätverk på grund av hög risk för svåra blödningar).

**OBS!** I sällsynta fall kan det behövas en komplettering med skrapning (kirurgisk).

#### **Komplikationer:**

Är dos beroende och förutom smärtor och illamående kan det debutera allergiska reaktioner mot *Mifepriston* eller *Misoprostol*, porfyri, svåra blödningar eller även ektopiska graviditet är rapporterade.

Mythergin och/eller Cytotec kan ges för att minimera blödningar.

### 2. **Vacuumexeres VEX (Kirurgisk abort)** (från om med graviditetsvecka 11+0)

Är rekommenderat till och med graviditetsveckan 11-12. Kirurgisk abort är en mekanisk skrapning som sker med hjälp av vakuumaspiration av uteruskaviteten efter föregående mekanisk dilatation av Cervix i narkos/lokalbedövning.

Rh-profylax.

### **Komplikationer:**

Komplikationer av en kirurgisk abort beror på graviditetslängden och erfarenhet hos kirurgen och är högst vid ingrepp med narkos. Viktigaste komplikationer är *blödningar, cervixskada, genital infektion* och *uterus perforation*.

### 3. **Sen abort (> graviditetsveckan 12)**

Framkallandet av värkarbete → utstötning av fostret och placenta.

Metoden som används vid sen abort kallas för två-steps metoden och har samma preparat som används vid den medicinska aborten, kan även kompletteras med skrapning i vissa fall.

### **Lagen om abort**

Abort lagen innebär att kvinnan till och med utgången av 18:e graviditetsveckan (v. 18+0) räknat från sista menstruationens första dag har rätt att själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten eller inte.

**OBS!** v. 18+1 krävas tillstånd från Socialstyrelsen och att särskilda skäl för abort föreligger.

**OBS!** Abort beviljas inte efter v. 22 förutom vid fall där barnet bedöms som icke livsduglig på grund av allvarlig skada ex. akrani (avsaknad av skallbenet) eller Trisomi 18 eller en abort kan beviljas under denna period om graviditeten på grund av sjukdom innebär en allvarlig fara för kvinnans liv/hälsa.