



the33



GASTRIT

Allmänt Histologiskt verifierad inflammatorisk reaktion med atrofi i ventrikelns slemhinna.

ICD-10 K30

Patofysiologi

Hereditet.

Typ A gastrit (Autoimmun atrofisk gastrit ofta kopplad till hypotyreoos, diabetes mellitus och vitiligo):

Bortfall av saltsyrasekretion och Intrinsic factor (IF). Livslång vitamin B12-substitution.

Risk för bakteriell överväxt i tunntarmen p.g.a. **Akyli** (labmässigt lågt Pepsinogen A, hos 80 % är gastrinnivåerna förhöjda - båda uppfyllda ger 100% specificitet).

Typ B-gastrit (antral):

Infektion med *Helicobacter Pylori* ger förhöjt serum Gastrin samt därmed också förhöjd saltsyraproduktion.

Typ AB-gastrit (pangastrit):

Infektion med *Helicobacter Pylori*, men låg saltsyra produktion. Finns ingen överensstämmelse mellan dyspeptiska symtom och histologiska fynd. Oklart i vilken utsträckning reflux av gallsyror, alkohol, kronisk HP-infektion, samt immunologiska reaktioner bidrar till utvecklingen av kronisk gastrit.

Diagnostik

Gastroskopi med px för PAD.

Lab:

S-vitamin B12, folsyra, S-metylmalonat och/eller S-homocystein.

P-glukos, HbA1c, *Helicobacter Pylori* test, S-gastrin och S-pepsinogen. Antikroppar mot endomysium/ transglutaminas.

1

Behandling

Vitamin B12 i injektionsform (Inj. Betolvex) vid bekräftad B12-brist.

Referenser

PM Praktisk medicin, femtonde upplagan.

L. Hallberg et al. Invärtes medicin.

Läkemedelsboken.