

GynObstetrik



PROM/PPROM

Health Department

the33 ©

Innehållsförteckning

PPROM.....	2
<i>Definition</i>	
<i>Incidens</i>	
<i>Diagnostik</i>	
<i>CTG</i>	
<i>Handläggning</i>	

1

Vattenavgång utan aktivt värkarbete PROM/PPROM

Definition→ PPROM (Eng. *Preterm Premature Rupture of Membrane*) är ett tillstånd med spontan vattenavgång utan regelbundna uterus kontraktioner efter 3 timmar.

Incidensen→ 10 % av alla graviditeter

Diagnostik→ efter visuell bedömning, exempelvis synligt vätskeflöde ur cervix vid undersökning med ett sterilt spekulum.

Infektion bör uteslutas (Temperatur, CRP, Leukocyter och urin- samt vaginal odling, se handläggning nedan)

CTG (verifiera fostrets välmående)

Fosterläge med yttre palpation

OBS! Tveksam vattenavgång betyder ingen vattenavgång och därför vid det minsta tveksamhet bör steril spekulum undersökning upprepas efter några timmar.

Handläggning

Handläggningen av vatten avgången beror på graviditets vecka och kan grovt delas som sammanfattad i tabell 13 nedan:

Tabell 13. Handläggning av vattenavgång [Ref. Kvinnokliniken Linköpings universitetssjukhus]

Graviditetsvecka ≥ 36+0	Graviditetsvecka < 36+0
Vattenavgång utan värk→ kontroll efter 10 tim för att säkerställa diagnosen. Temp CTG Induktion inom 24 tim med <i>Syntocinon</i> . Antibiotika profylax (om > 24 tim vattenavgång).	Inläggning på BB Urin odling Vaginal GBS odling Klamydia PCR CRP CTG Temp
OBS! Om det föreligger ett hinder för en akut induktion kan man avvakta det med en aktiv expektans under max 72 tim efter vatten avgången. Vaginalt GBS-odling+CRP+CTG+Temp.	Behandla med: <ul style="list-style-type: none">• Kortikosteroider vid hotande förtidsbörd och induktion av foster lungmognad (upp till vecka 33+6).• Ery-max vid infektionstecken.